


## ¿Conoce la Leishmaniosis?

La Leishmaniosis canina es una enfermedad de transmisión por parásitos, grave y crónica, provocada por la picadura de un insecto similar a un mosquito, llamado Flebotomo. En la actualidad, es una enfermedad incurable que disminuye seriamente la calidad de vida del perro y que puede llegar a causarle la muerte. El parásito que provoca esta enfermedad es conocido como *Leishmania*, del cual se deriva el nombre de la enfermedad.




Sus síntomas son:



## ¿Cómo puedo prevenir esta enfermedad?

El método idóneo para combatir la Leishmaniosis es controlar al Flebotomo transmisor, por tanto, la prevención es esencial.

Las medidas de prevención consisten en:

-  Evitar en la medida de lo posible la exposición del perro al Flebotomo. Sobre todo al anochecer, cuando los Flebotomos están más activos, especialmente en primavera y otoño.
-  Protegerlo con un producto antiparasitario externo con probada eficacia repelente contra el Flebotomo, prescrito por el veterinario.
-  Realizar un análisis de sangre al final del verano para asegurarnos de que no ha sido contagiado.

Enfermedades transmisibles

## La Leishmaniosis

Cómo prevenirla



Forum  
Bayer

[www.forumbayer.es](http://www.forumbayer.es)

La prevención es vida

Forum  
Bayer

[www.forumbayer.es](http://www.forumbayer.es)

La prevención es vida

## ¿Cómo se contagia mi perro?

A través de un insecto muy parecido a un mosquito pero mucho más pequeño, llamado Flebotomo. Al picar a un perro con Leishmaniosis, el Flebotomo se infesta con la enfermedad y la transmite a otros perros. Por ello, cuantos más perros prevenidos, menos perros infectados y, por tanto, menos riesgo para el colectivo.



Flebotomo

## ¿En qué zonas mi perro tiene mayor riesgo?

España es un lugar idóneo para el desarrollo del Flebotomo, debido al incremento de la temperatura global y a la reducción de lluvias causadas por el cambio climático. Las zonas con mayor número de perros enfermos de Leishmaniosis son las grandes urbes que presentan una mayor densidad de población canina, como Barcelona y Madrid, zonas cálidas y húmedas de Andalucía y la cuenca mediterránea (Cataluña, Levante y Baleares).



## ¿Cómo sabré si mi perro tiene Leishmaniosis?

Para diagnosticar la Leishmaniosis, tu perro requerirá de un examen clínico realizado por un profesional veterinario. Debes saber que, si la contrae, no podrá curarse, sino que tendrá que convivir con ella durante toda su vida. Sin embargo, con un buen control veterinario de forma regular y, si mantienes a tu perro bajo tratamiento, éste podrá tener una buena calidad de vida.



Crecimiento exagerado de las uñas



Alteraciones en la piel con descamación (zona del codo)

## ¿Mi perro puede contagiarme la Leishmaniosis?

La Leishmaniosis nunca se transmite de forma directa del perro al hombre, sino a través de la picadura del Flebotomo, y después de que hayan pasado unos 7 días para que dicho Flebotomo sea infestante. El riesgo de desarrollo de la Leishmaniosis aumenta sin embargo en pacientes inmunodeprimidos (enfermos de SIDA, personas que han recibido transplantes, mujeres embarazadas, afectados por stress, etc.).

